



**VAARA**

H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitystesteihin.
H410	Erittäin myrkylistä vesielölle, pitkäaikaisia haittavaikeutuksia.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261	Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämistä.
P280	Käytä suojauskäsitejä/suojaavatetusta/silmiensuojaista/kasvonsuojaajista.
P301+P310	JOS KEMIKALAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärin.
P302+P352	JOS KEMIKALAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338	JOS KEMIKALAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huumontista. El saa oleskennuttaa.
P331	Jos ilmenee ihärsystystä tai ihottumaata: Hakeudu lääkärin.
P333+P313	Jos ilmenee lääkäriin.
P337+P313	Jos lääkäriin.
P391	Valumatut on kerätävät.
EUH401	Noudata käytööhöjeitä ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**FARA**

H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidsseffekter. Irriterar huden.
H315	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H317	Orsakar allvarlig ögonirritation.
P102	Förvaras påtkomligt för barn.
P261	Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P331	Främkälla INTE kräkning.
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P391	Samla upp spill.
EUH401	För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

**Hätäpuhelinnroero / Nödtelefonnummer:**

Alarm 112, Myrkyytystokeskuksen 09-4711 ja 09-471 977 / Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977

**Rikkakasvien torjuuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs**

**Käyttötarkoitus / Användningsändamål:**

Rikkakasvien torjuuntaan peruna-, kumina-, syysvehnä-, syysruis-, ruisvehnä- ja syysohraviljelyksiltä.

Mot ogräs i potatis-, kummin-, höstvetete-, höstråg-, rågvete- och höstkönnodlingar.

**Tehoaine / Verksam substans:** Prosulfokarb / Prosulfokarb 800 g/l

**Valmistetyyppi / Preparattyp:** EC

**Rekisterinumero / Registreringsnummer:** 2793

**Käyttäjäryhmä / Användningsgrupp:** Ammatti-/käyttäjät / För yrkesbruk

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakkausen.

**Partinummer och tillverkningsdatum:** Se förpackningen.

# Nettopaino/Nettvolum: 10 L

**Rekisteröinnin haltija/Registereringsinnehavare**

Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44,  
2300 Köpenhamna S/Köpenhamn S, Tanska/Danmark

**Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare**

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Schweiz/Schweiz

**Edustaja Suomessa/Representant i Finland**

Syngenta Nordics A/S, Loukkutie 4,  
21110 Naantali/Nådendal, puh/tel 02-4367151



## Käyttötarkoitus

Rikkakasvien torjuntaan peruna-, kumina-, syysvehnä-, syysruis-, ruisvehnä- ja syysohraviljelyksiltä.

## Käytön rajoitukset

Varoajat: Varhaisperuna 42 vuorokautta ja kumina 75 vuorokautta.

## Ympäristöhaittojen ehkäisy

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesiliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin <sup>1)</sup>		
		50% vähennys	75% vähennys	90% vähennys
Peruna, kumina, syysviljat	10 m	5 m	3 m	3 m

<sup>1)</sup> Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivulta [www.tukes.fi/vesistorajoitus](http://www.tukes.fi/vesistorajoitus). Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Traktoriruiskun täytyöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täytlolaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvissuojeluvaine viedään vaarallisen jätteen keräysteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

## Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojarukkuja, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä.

Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojausta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojausta varustetulla P2/A2 suodattimella.

## **Käyttöohje**

Boxer on pääasiassa maan kautta vaikuttava rikkakasvien torjuntaan tarkoitettu valmiste. Jotta ainetta ei osuisi suoraan siemenen päälle, on kylvösienemenen oltava hyvin peittynyt ja kylvösyvyyden vähintään 3 cm. Kostea maa edistää tehoa ja pitkääikainen kuivus heikentää sitä.

## **Peruna**

Boxeria käytetään yleensä tankkiseokksena tai viljelyohjelmassa yhdessä muiden perunalle hyväksyttyjen valmisteiden kanssa. Käyttöaika on ennen perunan taimettumista ja/tai viimeistään perunan pääverson ollessa 1-lehtivaiheessa (BBCH 00-11), riippuen tankkiseosvalmisteen ominaisuuksista. Taimelletulon jälkeen ruiskutettaessa on perunan lehtien oltava kuivat, koska kosteus lehtien pinnalla lisää vioitusriskiä. Myös tankkiseokset lisäävät vioitusriskiä, kun ruiskutus tehdään taimelletulon jälkeen.

Boxerin käyttömäärä on 2-4 l/ha kertakäsittelynä tai  $2 \times 2-2,5$  l/ha jaettuna käsittelynä + tankkiseosvalmiste. Jaettussa käsittelyssä vähintään 7-10 päivän väli edelliseen ruiskutukseen.

## **Kumina**

Boxeria käytetään yleensä tankkiseokksena tai viljelyohjelmassa yhdessä muiden kuminalle hyväksyttyjen valmisteiden kanssa. Käyttöaika on kylvövuonna ennen kuminan taimettumista ja/tai sen jälkeen (BBCH 00-22) sekä satovuonna sadonkorjuun jälkeen. Taimelletulon jälkeinen käsittely suoritetaan kun viljelykasvissa on 1-2 kasvulehteä.

Boxerin käyttömäärä on yksinään käytettäessä 2-4 l/ha kertakäsittelynä, tankkiseoksissa 1 l/ha. Jaettu käsittely  $2 \times 2$  l /ha, jolloin ensimmäinen käsittely ennen taimettumista ja toinen sen jälkeen.

## **Syysviljat (syysvehnä, syysruis, ruisvehnä ja syysohra)**

Boxeria käytetään tankkiseokksena tai viljelyohjelmassa yhdessä muiden syysviljoille hyväksyttyjen valmisteiden kanssa. Käyttöaika on syksyllä ennen viljan orastumista ja viimeistään, kun siemenitoiset rikkaheinät ovat 2-lehtivaiheessa (viljan BBCH 00-21). Yleensä paras teho saavutetaan viljan 2-lehtivaiheessa (BBCH 10-11).

Boxerin käyttömäärä on 1-5 l/ha. Rikkakasvilajistosta riippuen tehoa voi täydentää vielä keväällä ruiskuttamalla kasvusto jollakin toisella samaan käyttötarkoitukseen hyväksyllä valmisteella.

**Vesimäärä:** 100-400 l/ha.

## **Ruiskutusnesteen valmistaminen**

Täytä ruisku puolilleen vedellä. Lisää valmiste/valmisteet erikseen ja lopuksi täytä tankki sekoituksen ollessa ajan pääällä. Ruiskuteliuoksen on oltava koko ajan sekoituksessa pellolle ajettaessa ja ruiskutettaessa.

## **Huomautukset**

Ei tehoa leveälehtisiin ja heinämäisiin juuririkkakasveihin.

Boxer tehoa seuraaviin rikkakasveihin: matara, pillike, peltoemäkki, peltolem-mikki, ristikukkaiset rikkakasvit (lutukka, taskuruoho ym.), pihatähimö, peippi, mustakoiso, tädyke, jauhosavikka, kylämaltsa, kylänurmikka, luoho, raiheinä ja rikkapuntarpää.

Maan hyvä kosteustila edistää ja kuivuus heikentää tehoa.

Kylvöalustan tulisi olla tasainen ja ilman suuria kokkareita. Boxerin teho heikkeenee multavilla mailla. Paras aika ruiskutukselle on ennen rikkakasvien taimettumista tai mahdollisimman pienellä taimiasteella, mikä varmistaa tehoa etenkin kuminan viljelyssä. Mitä kuivempaa, kokkareisempaa ja multavampaa maa on ja mitä suurempia rikkakasvit ovat, sitä suurempaa käytömäärää käytetään.

Mikäli syysviljakasvusto kärsii hapenpuutteesta, voi sillä esiintyä ohimenevää kellarustumista, mikä ei vaikuta satoon. Märkyydestä, kuivuudesta, yöpakkasista, ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa.

Mikäli kasvusto joudutaan rikkomaan ennen sadonkorjuuta, voi Boxerilla käsitellylle lohkolle kylvää seuraavana vuonna mitä tahansa muuta viljelykasvia. Samana vuonna voi Boxerilla käsitellylle alalle kylvää syysviljoja tai syrsapsia.

Säilytetään kuivassa, hyvin tuuletetussa tilassa ja 0 - +35 °C lämpötilassa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisten käytettäväksi kasvin-suojeluaineena 18.12.2013.

## **Vastuuiklausuuli**

Syngenta Nordics A/S vastaa siitä, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan viranomaisille ilmoitetun mukaista. Valmistaja ei vastaa valmisten vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä tai jos tuotetta on käytetty virheellisesti tehdyn varastoinnin jälkeen. Sääolot, kasviston ja maan kunto, lajikeominaisuudet, resistenssi yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen.

## **Rekisteröidyt tavaramerkit**

Syngenta Group Company: Boxer®

## Användningsändamål

Mot ogräs i potatis-, kummin-, höstvete-, höstråg-, rågvete- och höstkornodlingar.

## Begränsningar i användningen

Karenstid: Tidig potatis 42 dygn och kummin 75 dygn.

## Förebyggande av skador på miljön

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som är begränsade till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Användningsändamål	Typ av spridningsmunstycken				
	Spalmunstycke	Vindavdriftsreducerande munstycken <sup>1)</sup>			
		50% reducering	75% reducering	90% reducering	
Potatis, kummin, höstsäd	10 m	5 m	3 m	3 m	

<sup>1)</sup> Vindavdriftsreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans. Vindavdriftsreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida [www.tukes.fi/vattendragsbegrensning](http://www.tukes.fi/vattendragsbegrensning). Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstryckena.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Överblivet, oanväntbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

## Skyddsanvisningar

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad användas.

Vid arbetssituationer där det finns fara för stänk bör även ansikts-/ögonskydd användas och då det finns risk att andningsorganen utsätts bör dessutom andningsskydd försett med P2/A2 filter användas.

## **Bruksanvisning**

Boxer är främst ett jordverkande preparat mot ogräs. För att undvika att preparat hamnar direkt på utsäde/frö, bör det vara väl inmyllat och sådjupet minst 3 cm. God markfukt gynnar effekten och en långvarig torka försvagar den.

## **Potatis**

Boxer används i allmänhet i tankblandning eller i ett program med andra för potatis godkända preparat. Använtningstiden är före potatisens uppkomst och/eller senast då potatisens huvudskott är i 1-bladstadie (BBCH 00-11), beroende på tankblandningspreparatets egenskaper. Vid besprutning efter plantuppkomst bör bladen vara torra. Om bladen är fuktiga ökar risken för sprutningsskador. Också tankblandningar ökar risken för skada, då man sprutar efter uppkomsten.

Bruksmängden för Boxer är 2-4 l/ha vid engångsbehandling och 2 x 2-2,5 l/ha vid delad behandling + tankblandningspreparat. Vid delad behandling bör det vara minst 7-10 dagar mellan besprutningarna.

## **Kummin**

Boxer används i allmänhet i tankblandning eller i ett program med andra för kummin godkända preparat. Använtningstiden är under insåningsåret före och/eller efter uppkomsten av kummin (BBCH 00-22) och under skördeåret efter skörden. Vid behandling efter uppkomsten bör odlingsväxten ha 1-2 växtblad.

Bruksmängden för Boxer är 2-4 l/ha vid engångsbehandling, vid tankblandning 1 l/ha. Vid delad behandling 2 x 2 l/ha, varvid den första behandlingen sker innan plantetableringen och den andra efter plantetablering.

## **Höstsäd (höstvete, höstråg, rågvete och höstkorn)**

Boxer används i tankblandning eller i ett program med andra för höstsäd godkända preparat. Använtningstiden är på hösten innan stråsädens uppkomst och senast då de fröburna gräsogräsen är i 2-bladstadiet (spannmålen BBCH 00-21). I allmänhet fås den bästa effekten vid stråsädens 2-bladstadie (BBCH 10-11). Bruksmängden för Boxer är 1-5 l/ha. Beroende på ogräsfloran kan effekten kompletteras på våren genom att bespruta beståndet med ett annat för ändamålet godkänt preparat.

**Vattenmängd:** 100 - 400 l/ha.

## **Beredning av sprutvätskan**

Fyll sprutan till hälften med vatten. Tillsätt preparatet/preparaten var för sig och till sist resten av vattnet medan blandningen är i gång. En omrörning av sprutvätskan bör fortsätta kontinuerligt även under transport och sprutningsarbete.

## **Anmärkningar**

Har inte effekt mot bredbladiga och gräsartade rotogräs.

Boxer har effekt på följande ogräs: snärjmåra, dån, jordrök, förgätmigej, korsblomstriga ogräs (lomme, penningört etc.), våtarv, plister, nattskatta, veronica, svinmålla, målla, vitgröe, åkerven, rajgräs och renkavle.

God markfukt gynnar och torka försvagar effekten.

Såbädden skall vara jämn och utan stora kokor. Effekten av Boxer är sämre på mulljordar. Den bästa tiden för besprutning är innan ogräsens uppkomst eller i småplantsstadiet, detta försäkrar effekten speciellt i kumminodling. Ju torrare, kokigare och högre mullhalt jorden har och ju större ogräsen är, desto högre bruksmängd bör användas. Om höstsäden lider av syrebrist, kan övergående gulnande förekomma, som inte har effekt på skördens. Bestånd som lider av blöta, torka, nattfrost, brist på näringssämnen, sjukdomar eller av någon annan stressfaktor får inte besprutas.

Om beståndet måste harvas upp/sås om innan skörd, kan man följande år så en valfri gröda på ett fält som har behandlats med Boxer. På fält som behandlas med Boxer kan man samma år så höstsäd eller höstraps.

Förvaras torrt, i ett väl ventilerat utrymme med en temperatur på mellan 0 - +35 °C.

Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel 18.12.2013.

## **Ansvarsklausul**

Syngenta Nordics A/S är ansvarig för att produkten har den sammansättning, som är anmäld till myndigheterna, såvida den finns i originalförpackning, lagras och används enligt etikett.

Syngenta frantar sig allt ansvar för produktens effekt samt skador, även följdskador, som uppstått genom felaktig lagring och användningssätt. Var uppmärksam på att faktorer såsom väder, markförhållanden, sorter, resistens, behandlingsteknik kan påverka produktens effekt.

## **Registrerade varumärken**

Syngenta Group Company: *Boxer*®









**VAARA**

H304	Voi olla tappavaa nieltyä ja joutuessaan hengitysteihin.
H410	Erittäin myrkyllistä vesiliölille, pitkääikäisissä haittaavaliukutuksia.
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261	Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämästä.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojaavatetusta/silmensuojainta/kasvonsuojainta.
P301+P310	JOS KEMIKALAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSIETOKESKUKSEEN tai lääkärin.
P302+P352	JOS KEMIKALAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338	JOS KEMIKALAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piloilossit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huutomista.
P331	El saa osoittua.
P333+P313	Jos ilmeense ihoärsyystä tai ihottumaata: Hakeudu lääkärin.
P337+P313	Jos silmää-ärsytsä jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P391	Valumatut on kerättävä.
EUH401	Noudata käytööhjelmaa ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**FARA**

H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H410	Myccket giftigt för vattenlevande organismer med långtidsseffekter.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
P102	Orsakar allvarlig ögonirritation.
P261	Förvaras oätkomligt för barn.
P280	Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej.
P301+P310	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
P302+P352	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P305+P351+P338	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

FRAMKALLA INTE kräckning.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

**Hätäpuhelinnumero / Nödtelefonnummer:**

Alarm 112, Myrkytystekeskus 09-4711 ja 09-471 977 / Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977

**Rikkakasvien torjuuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs**

**Käyttötarkoitus / Användningsändamål:**

Rikkakasvien torjuuntaan peruna-, kumina-, syysvehnä-, syysruis-, ruisvehnä- ja syysorhaviljelyksiltä.

Mot ogräs i potatis-, kummin-, höstvete-, höstråg-, rågvete- och höstkornodlingar.

**Tehoaine / Verksam substans:** Prosulfokarbi / Prosulfokarb 800 g/l

**Valmistetyyppi / Preparattyp:** EC

**Rekisterinumero / Registreringsnummer:** 2793

**Käyttäjäryhmä / Användningsgrupp:** Ammattikäyttäjät / För yrkesbruk

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** Katso pakauksen.

**Partinummer och tillverkningsdatum:** Se förpackningen.

# Nettopaino/Nettvolum: 10 L

**Rekisteröinni haltija/Registreringsinnehavare**

Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvæj 44,  
2300 Köpenhamina S/Köpenhamn S, Tanska/Danmark

**Valmistaja ja pakaja/Tillverkare och förpackare**

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveitsi/Schweiz

**Edustaja Suomessa/Representant i Finland**

Syngenta Nordics A/S, Loukkutie 4,  
21110 Naantali/Nådendal, puh/tel 02-4367151



5 707239 301551

