



syngenta®

Käyttötarkoitus

Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsilä, syys- ja kevätrypsilä, herneeltä, pavulta, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaa-
liilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Användningsändamål

Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårybs, höst- och vårraps, ärtor, bönor, vitkål, blomkål, broccoli och brysselkål, äppel och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradoskalbaggen i potatis.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME[®], the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON[®] are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 L

Tuhoeläinten torjuntaan

Tehoaine: Tau-fluvalinaatti 240 g/l

Valmistetyyppi: EW

Rekisterinumero: 3450

Skadedjursmedel

Verksam substans: Tau fluvalinat 240 g /L

Preparattyp: EW

Registreringsnummer: 3450



UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.,
(TAU-FLUVALINATE)

Varoitus

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Varning

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriliä) ja päähinettä.

Skyddsanvisningar

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddskläder, kemikalie beständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.

Nettotilavuus/Nettovolum: 1 L

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare

ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg
87, 3830 AK Leusden, Holland

Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare

ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg
87, 3830 AK Leusden, Holland

Edustaja/Representant

Syngenta Nordics A/S, Loukkutie 4, 21110
Naantali/Nådendal, puh/tel 02-4367151

Valmistuserä ja valmistuspäivä: Katso pakkus.

Partinummer och tillverningsdatum: Se förpackningen.



5 707239 301674

Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus

Käyttöohjeessa mainittujen tuohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsiiltä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, pavulta, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Käytön rajoitukset:

Varo aika kaaleilla, tuoreella herneellä ja perunalla 7 vrk, kuivatulla herneellä ja pavulla 14 vrk, viljoilla, omenalla ja päärynällä 30 vrk, syys- ja kevätrypsiillä, syys- ja kevätrapsilla 60 vrk. Kukka-akaalilla varo aika lasketaan ensimmäisestä keruusta.

Valmisteen myöhäisin käyttöajankohta on öljykasveilla kukinnan alkaessa. Omenalle, päärynälle, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaalille valmistetta saa käyttää kerran, muilla kasveilla korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana.

Resistenssin hallinta:

Valmisteen (tehoaineryhmä 3A, pyretroidit) käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota resistenssinhallintaan ja sen takia käsittelyjen määrä on minimoitava vuorottelemalla käyttöä muiden, vaikutustavaltaan (MoA) eri tehoaineryhmään kuuluvien, valmisteen kanssa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin ¹⁾		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Viljat, syys- ja kevätrypsi, syys- ja kevätrapsi	Ei sallittu	Ei sallittu	15 m	5 m
Herne, papu ja peruna	Ei sallittu	20 m	10 m	5 m

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin ¹⁾		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Valko-, kukka-, ruusu- ja parsakaali	Ei sallittu	Ei sallittu	20 m	10 m
Omena ja päärynä	Ei sallittu	Ei sallittu	Ei sallittu	30 m

¹⁾Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätetieeseen.

Käyttöohje:

Evure Neo on laajatehoinen, pääosin kosketusvaikutteinen kasvinsuojeluaine, minkä vuoksi ruiskutusnesteen saattaminen tasaisesti kasvustoon on tärkeää valmisteen imeytymiseksi lehden pinnan vahakerrokseen. Riittävän tehon takaamiseksi ruiskutusneste on tärkeää saada kohteeseensa mahdollisimman hyvin.

Valmiste vaikuttaa estämällä tuhohyönteisten jänniteherkkien Na⁺-kanavien toimintaa hermokalvoissa ja elektronien siirtymistä hermostossa, jolloin tuhohyönteinen lamaantuu ja kuolee.

Kasvi	Torjuttava tuhohyönteinen	Kasvu-aste (BBCH)	käyttö-määrä l/ha	Käsitte-lyjen lkm	Vesi-määrä l/ha	Ruiskutus-väli vrk	Huomioitavaa
Syys- ja kevätviljat keväällä	Kirvat, ripsiäiset, viljakukko	10 – 50	0,15 -0,2	1 -2	100 - 400	10 -14	Max 2 käsittelyä
	Tähkä- ja vehnäsääski	41 - 59					
Syys- ja kevätrypsi, syys- ja kevätrapsi	Rapsikuoriainen, rap-sikärsäkäs, litusääski, luteet	30 - 60	0,2	1 -2	100 – 300	7	Max 2 käsittelyä
Herne ja papu	Juovahernekärsä-käs	10 – 19	0,2	1 -2	100 – 300	14	Max 2 käsittelyä
	Herne- ja juurikaskirva, -ripsiäinen ja -kääriäinen	50 -71		1 -2		14	
Peruna	Kirvat, koloradon-kuoriainen erityisohjeiden mukaisesti ***	12 - 49	0,2	1 -2	100 - 400	14	Max 2 käsittelyä

Kasvi	Torjuttava tuohyönteinen	Kasvu-aste (BBCH)	käyttö-määrä l/ha	Käsitte-lyjen lkm	Vesi-määrä l/ha	Ruiskutus-väli vrk	Huomioitavaa
Valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaali	Kaalikirva, rapsikuoriainen	10 - 49	0,3	1	200 - 400	-	Max. 1 käsittely
Omena ja päärynä	Omena-, omenanratamo- ja omenankäärökirva, pihlajan-marjakoi	51 - 79	0,3	1	500 - 1000	-	Max. 1 käsittely

***Koloradonkuoriaishavainnoista on viipymättä ilmoitettava Ely-keskuksen maaseutu- ja energiayksikköön tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, joka määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi.

Ruiskutukseen käytetään vettä 100-400 l/ha kasvuston tiheyden ja tuholaisten olinpaikan mukaan. Omena- ja päärynätarhoissa vesimäärä on 500 - 1 000 l/ha. Valmisteen tasaiseen leviämiseen on kiinnitettävä huomiota valitsemalla tarkoitukseen parhaiten sopiva suutin ja paine.

Torjunnan kynnsarvot:

Rypsi ja rapsi

Rapsikuorianen: 1 kuoriainen/kasvi varhaisella nuppuasteella, 2-3 kuoriaista/kasvi vähän ennen kukintaa.

Rapsikärsäkäs: ennen kukintaa 1 kärsäkäs/4 kasvia.

Litusääski: 0,5-2 sääskeä/kasvi. Sääsket munivat kehittyvän lidun sisään rapsikärsäkkään tekemien reikien kautta, joten kärsäkkäiden torjunta vähentää myös litusääsken aiheuttamia tuhoja.

Viljat

Viljan kirvat: Viljan kirvojen torjunnassa kirvojen tullessa kasveihin. Valmistetta käytetään tuomikirvojen torjuntaan vain, jos viruslevinnän vaara on ilmeinen.

Vehnän sääsket: Torjunnan kynnsarvo on 1 sääski/6-7 tähkää. Uusintäkäsittely tarvittaessa 4-5 vrk:n kuluttua.

Käsittele kasvusto tuholaisoireiden alkaessa tai torjuntakynnyksen ylittyessä.

Herne ja papu

Hernekääriäinen: Torjunta kukinnan aikana klo 22 ja 06 välillä. Torjunnan ajoitus ja tarve toukuihin kohdistuen arvioidaan feromonipyydysten avulla. Ohjeellinen torjunnan kynnsarvo ruokaherneen tuotannossa on vähintään 10 kääriäistä/pyydys ja tuoreherneen tuotannossa vähintään 3 kääriäistä/pyydys kahtena peräkkäisenä tarkastuskertana.

Valmistetta ei käytetä herneellä yksinomaan hernekivan torjuntaan.

Kaalit

Rapsikuoriainen: kukkakaalilla tarkkailun perusteella kukinnan aikaan ensimmäisen sadon valmistuessa varoaika huomioiden.

Omena ja päärynä

Torjunta tarkkailutietojen perusteella.

Ruiskutusnesteiden valmistus:

Tankki täytetään puolilleen vedellä ja Evure Neo -valmiste sekä loput vedestä lisätään sekoittajan käydessä. Tankkiseosta käytettäessä tankki täytetään puolilleen vedellä, annetaan sekoittajan käydä koko ajan, lisätään Evure Neo -valmiste, mahdolliset muut valmisteet ja loput vedestä.

Sekoitettavuus:

Evure Neo -valmiste voidaan ruiskuttaa samanaikaisesti useiden rikkakasvi- ja kasvitautientorjunta-aineiden ja liuosmaisten kasviravinteiden kanssa, lukuun ottamatta ureaa.

Kun seoksessa on boori-lannoitteita, vettä tulee käyttää vähintään 200 l/ha. Tällöin Evure Neo -valmiste sekoitetaan miltei täyteen vesimäärään ja boorilannoite lisätään ruiskutusnesteeseen viimeisenä. Sakkaantumisriski on korkein, kun veden pH on korkea. Ruiskutusneste tulee käyttää heti seoksen tekemisen jälkeen.

Huomautukset:

Torjunta tulee tehdä torjunnan kynnysarvojen mukaisesti, vain optimaalisissa olosuhteissa ja parasta ruiskutustekniikkaa käyttäen. Valmiste ei ole herkkä UV-säteilylle, joten auringon valo ei nopeuta sen hajoamista.

Valmiste on säilytettävä alkuperäispakkauksessa -10. ja + 30 asteen välillä olevassa lämpötilassa. Älä valmista ruiskutusnestettä enempää kuin on tarve.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 18.1.2018.

Vastuuklausuli:

Valmistaja vastaa siitä, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan viranomaisille ilmoitetun mukaista. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä tai jos tuotetta on käytetty virheellisesti tehdyn varastoinnin jälkeen. Sääolot, kasvuston ja maan kunto, lajikeominaisuudet, resistenssi yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen.

Lisätietoja tuotteesta osoitteessa www.syngenta.fi

Rekisteröidyt tavaramerkit

Syngenta Group Company: EVURE Neo



Användargrupp: Endast för yrkesbruk

Användningsänmål:

Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårrys, höst- och vårraps, ärter, bönor, vitkål, blomkål, broccoli och brysselkål, äpplen och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradoskalbaggen i potatis.

Begränsningar i användningen:

Karenstid i kål, gröna ärter och potatis sju dagar, och i torkade ärter och bönor 14 dagar, spannmål, äpplen och päron 30 dagar, höst- och vårrys, höst- och vårraps 60 dagar. För blomkål beräknas karenstiden från första skördeomgången.

Preparatet får inte användas för oljeväxter senare än i början av blomningen. I äpple, päron, vitkål, blomkål, broccoli och brysselkål får preparatet endast användas en gång, i andra växtslag upp till två gånger under växtsäsongen.

Hantering av resistens:

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt resistenshantering vid användningen av preparatet (aktiv beståndsdel grupp 3A, pyretroider) och därför bör antalet behandlingar minimeras genom att alternera med andra preparat med andra verkningsätt (MoA) och som hör till en annan grupp av verksamma substanser.

Förebyggande av skador på miljön:

Förörena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder. Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som är begränsade till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Gröda	Munstycke			
	Spaltspridar	Avdriftsreducerande munstycke ¹⁾		
		50 % reduktion	75 % reduktion	90 % reduktion
Spannmål, höst- och vårrys, höst- och vårraps	Ej tillåtet	Ej tillåtet	15 m	5 m
Ärter, bönor och potatis	Ej tillåtet	20 m	10 m	5 m

Gröda	Munstycke			
	Spaltspridar	Avdriftsreducerande munstycke ¹⁾		
		50 % reduktion	75 % reduktion	90 % reduktion
Vitkål, blomkål, brysselkål och broccoli	Ej tillåtet	Ej tillåtet	20 m	10 m
Äpple och päron	Ej tillåtet	Ej tillåtet	50 m	30 m

¹⁾Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans. Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida www.tukes.fi/vesitorajoitus. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstrycken.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddskläder, kemikalie beständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.

Bruksanvisning:

Evure Neo är ett, övervägande kontaktverkande växtskyddsmedel med bred effekt. Därför är det viktigt att ha en god täckning av växtdelarna för att produkten ska absorberas i vaxlagret. För att säkerställa tillräcklig effekt är det viktigt att sprutvätskan tränger så långt in i grödan som möjligt.

Produkten fungerar genom att blockera aktiviteten hos de spänningsskänliga Na⁺ -kanalerna i skadeinsekternas centrala nervsystem och elektronmigrationen i nervsystemet, vilket orsakar förlamning och död hos insekterna.

Vegetabiliska	Störande skadedjur	Utvecklingsstadium (BBCH)	Den använda mängden av L/ha	Antal behand lingar	Vattenmängd L/ha	Sprutintervall per dag	Anmärkningar
Höst- och vårsäd på våren	Bladlöss, tripsar, sädesbladbagge,	10 – 50	0,15 -0,2	1 -2	100 - 400	10 -14	Max 2 behand lingar
	röda vetemygga och gula vetemygga	41 - 59					
Höst och vår rybs, höst- och vårraps	Rapsbagge, rapsvivel, skidgallmygga, ängsstinkfly	30 - 60	0,2	1 -2	100 – 300	7	Max 2 behand lingar
Ärt och böna	Randig ärtvivel	10 – 19	0,2	1 -2	100 – 300	14	Max 2 behand lingar
	Ärt- och betbladlöss, trips och stritar	50 -71		1 -2		14	

Vegetabiliska	Störande skadedjur	Utvecklingsstadium (BBCH)	Den använda mängden av L/ha	Antal behand lingar	Vattenmängd L/ha	Sprutintervall per dag	Anmärkningar
Potatis	Bladlöss, koloradoskalbaggar enligt speciella instruktioner ***	12 - 49	0,2	1 -2	100 - 400	14	Max 2 behand lingar
Vit-, blom- och brysselkål, broccoli,	Kålbladlus, rapsbaggar	10 - 49	0,3	1	200 - 400	-	Max. 1 behandling
Äpple och päron	Äppel- och andra typer av bladlöss, rönnbärsmal	51 – 79	0,3	1	500 – 1000	-	Max. 1 behandling

*** Fynd av koloradoskalbaggar skall omedelbart anmälas till Ely-centrumets landsbygdsenergienhet eller Livsmedelssäkerhetsmyndigheten Evira, som ska fastställa åtgärder för destruktions av skalbaggar. (I Sverige: Kontakta Länsstyrelsen eller Jordbruksverket om du hittar fullvuxna koloradoskalbaggar, ägg eller larver. Döda uppsamlade insekter med kokande vatten)

Vattenmängden är vid besprutning från 100 - 400 L/ha beroende på beståndets täthet och skadeprets placering på växterna. I äpplen och päron är mängden vatten mellan 500-1000 L/ ha. Försiktighet bör vidtas för att säkerställa jämn spridning av preparaten genom att välja munstycket och trycket som passar bäst för ändamålet.

Tröskelvärden vid bekämpning:

Rybs och raps

Rapsbaggar: 1 skalbagge / växt vid tidigt angrepp, 2-3 skalbaggar / växt kort före blomningen.

Rapsvivel: före blomning 1 vivel / 4 växter.

Skidgallmygga: 0,5-2 myggor / växt. Myggen lägger ägg i hålen som viveln orsakar, så genom vivelbekämpning minskar också skadorna som orsakas av skidgallmygga.

Spannmål

Sådesbladlus: Vid bekämpning av bladlöss i spannmål då bladlöss börjat förekomma på växterna. För bekämpning av häggbladlus endas om uppenbar risk finns för spridning av virusVete- mygga: Tröskelvärdet är 1 mygga / 6 till 7 ax. Upprepa behandlingen efter 4-5 dagar.

Behandla grödan när symptom för angrepp av skadeinsekter uppstår eller då bekämpningströskeln överskrids.

Ärt och böna

Ärtvecklare: Bekämpning under blomningen mellan kl. 22 och 06. Bekämpningstidpunkt och behovet av bekämpning av larverna beräknas med hjälp av feromonfällor. Det vägledande tröskelvärdet för bekämpning i produktionen av matärt är minst 10vecklare per fälla och i produktionen av gröna ärtar minst 3vecklare per fälla i två på varandra följande inspektioner.

Preparatet används inte i ärtar enbart för bekämpa ärtbladlus.

Kål

Rapsbaggar: på blomkål genom observation vid blomningstid när den första skörden är på gång att bli klar att sköras med iakttagande av karenstiden.

Äpple och päron

Bekämpning baserad på observationsdata.

Framställning av sprutvätska:

Tanken fylls till hälften med vatten och Evure Neo 2F samt resten av vattnet tillsätts medan blandaren är påslagen. Vid framställning av tankblandning fylls tanken till hälften med vatten, blandaren får gå hela tiden, tillsätts Evure Neo, de övriga preparaten och den resterande mängden vatten.

Blandbarhet:

Evure Neo preparatet kan appliceras samtidigt med ett antal herbicider, fungicider och flytande växtnäringsämnen, med undantag av urea.

Om det finns borgödsel i blandningen ska minst 200 l / ha vatten användas. I detta fall blandas Evure Neo-preparatet med större delen vatten och borgödseln tillsätts efteråt i den nästan fulla mängden av sprutvätska. Den högsta risken för sedimentering är när vattnets pH är högt. Sprutvätskan bör användas omedelbart efter blandning.

Anmärkningar:

Bekämpning bör utföras utgående från gränsvärden för bekämpning, endast under optimala förhållanden och med bästa sprutteknik. Preparatet är inte känsligt för UV-strålning, så solljus accelererar inte dess nedbrytning.

Preparatet ska förvaras i originalförpackningen vid en temperatur mellan - 10 °C och + 30 °C. Blanda inte till mer sprutvätska än nödvändigt.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel 18.1.2018.

Ansvarsklausul:

Tillverkaren ansvarar för att preparatet har sådan sammansättning som anmälts till myndigheterna, då preparatet finns i sin originalförpackning och har lagrats på rätt sätt. Tillverkaren ansvarar inte för preparatets effekt under avvikande förhållanden, vid felaktig användning eller efter en felaktig lagring. Vädret, växtbeståndets och markens skick, sortegenskaper, resistens och liknande faktorer påverkar bekämpningens resultat.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.fi

Registrerade varumärken

Syngenta Group Company: *EVURE Neo*



syngenta®

Käyttötarkoitus

Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsilä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, pavulta, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaa-
lilta, omenalta ja päärynältä sekä koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Användningsändamål

Bekämpning av i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps, ärtor, bönor, vitkål, blomkål, broccoli och brysselkål, äppel och päron, samt, endast i enlighet med instruktioner från myndigheterna, vid bekämpning av koloradoskalbaggen i potatis.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 L

Tuhoeläinten torjuntaan

Tehoaine: Tau-fluvalinaatti 240 g/l

Valmistetyyppi: EW

Rekisterinumero: 3450

Skadedjursmedel

Verksam substans: Tau fluvalinat 240 g /L

Preparattyp: EW

Registreringsnummer: 3450



UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.,
(TAU-FLUVALINATE)

Varoitukset

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Varning

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriliä) ja päähiinettä.

Skyddsanvisningar

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddskläder, kemikalie beständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) samt huvudbonad användas.

Nettotilavuus/Nettovolum: 1 L

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare

ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg
87, 3830 AK Leusden, Holland

Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare


ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg
87, 3830 AK Leusden, Holland

Edustaja/Representant

Syngenta Nordics A/S, Loukkutie 4, 21110
Naantali/Nädendal, puh/tel 02-4367151

Valmistuserä ja valmistuspäivä: Katso pakkus.

Partinummer och tillverkningsdatum: Se förpackningen.



5 707239 301674

