750ml

approx. measure

500ml

250ml

Evure Neo

syngenta

HYÖNTEISMYRKKY / INSEKTICID

GROUP 3A INSECTICIDE

Käyttötarkoitus
Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsiltä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, pavulta, perunalta, valko-, puna-, suippo-, savoijin-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä, porkkanalta, sokeri-, puna- ja rehujuurikkailta.

Användningsändamål
Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårraps, höst- och vårrybs, ärter, bönor, potatis, vit-, röd-, spets-, savoy-, blom- och rosenkål, broccoli, äpple och päron, morot, socker-, foder- och rödbetor.

L1158866 FINL/10E PPE 4263066

1 L

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company



VAROITUS
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P391 Valumat on kerättävä.
EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNING
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P391 Samla upp spill.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tuhoeläinten torjuntaan / Skadedjursmedel

Suojainohjeet / Skyddsutrustning: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. / Vid hantering av produkten bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad.

Tehoaine / Verksam substans: Tau-fluvalinaatti 240 g/l (24% w/v) / Tau fluvalinat 240 g /L (24% w/v)

Valmistetyyppi / Preparattyp: EW

Användargrupp / Käyttäjäryhmä: Yrkesanvändare / Ammattikäyttäjät

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3450

Nettotilavuus/Nettovolum: 1 L

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare
ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg 87, 3830 AK Leusden, Holland
Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare
ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg 87, 3830 AK Leusden, Holland
Edustaja/Representant
Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S, Tanska/Danmark, Tel +45 32 87 11 00

Valmistuserä ja valmistuspäivä: Katso pakkus.

Partinummer och tillverningsdatum: Se förpackningen.

5 707239 302855

L1158866 FINL/10E PPE 4263066

Evure Neo

syngenta

HYÖNTEISMYRKKY / INSEKTICID

GROUP 3A INSECTICIDE

Käyttötarkoitus
Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsiltä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, pavulta, perunalta, valko-, puna-, suippo-, savoijin-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä, porkkanalta, sokeri-, puna- ja rehujuurikkailta.

Användningsändamål
Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårraps, höst- och vårrybs, ärter, bönor, potatis, vit-, röd-, spets-, savoy-, blom- och rosenkål, broccoli, äpple och päron, morot, socker-, foder- och rödbetor.

L1158866 FINL/10E PPE 4263066

1 L

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company



VAROITUS
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P391 Valumat on kerättävä.
EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNING
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P391 Samla upp spill.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tuhoeläinten torjuntaan / Skadedjursmedel

Suojainohjeet / Skyddsutrustning: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. / Vid hantering av produkten bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalieresistenta skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad.

Tehoaine / Verksam substans: Tau-fluvalinaatti 240 g/l (24% w/v) / Tau fluvalinat 240 g /L (24% w/v)

Valmistetyyppi / Preparattyp: EW

Användargrupp / Käyttäjäryhmä: Yrkesanvändare / Ammattikäyttäjät

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3450

Nettotilavuus/Nettovolum: 1 L

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare
ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg 87, 3830 AK Leusden, Holland
Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare
ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg 87, 3830 AK Leusden, Holland
Edustaja/Representant
Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S, Tanska/Danmark, Tel +45 32 87 11 00

Valmistuserä ja valmistuspäivä: Katso pakkus.

Partinummer och tillverningsdatum: Se förpackningen.

5 707239 302855

L1158866 FINL/10E PPE 4263066

750ml

approx. measure

500ml

250ml

Evure Neo

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varoaika

Kaalit: 7 vrk
Tuoreherne: 7 vrk
Peruna: 7 vrk
Kuivattu herne: 14 vrk
Papu: 14 vrk
Viljat: 30 vrk
Sokerijuurikas, rehujuurikas ja punajuurikkaat: 14 vrk
Porkkana: 14 vrk
Omena: 30 vrk
Päärynä: 30 vrk
Syys- ja kevätrypsi: 60 vrk
Syys- ja kevätrapsi: 60 vrk

Pohjavesirajoitus

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat 1 ja 2). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulee välttää.

Pölyttäjärajoitus

Niveljalkaisten suojelemiseksi on jätettävä suojaetäisyydet (m) käsittelyalueen ulkopuoliseen kasvillisuuteen ja/tai käytettävä tuulikulkeumaa alentavia suuttimia (%).

Käyttökohde	Suutintyyppi		
	Viuhkasuutin	Tuulikulkemaa vähentävä suutin	
		50 %	75 %
Viljat, syys- ja kevätrypsi, syys- ja kevätrapsi	15 m	10 m	5 m
Herne, papu ja peruna	15 m	10 m	5 m
Valko-, kukka-, ruusu- ja parsakaali	15 m	10 m	5 m
Porkkana	20 m	10 m	5 m
Juurikkaat, punajuurikkaat	15 m	10 m	5 m
Omena ja päärynä	50 *	30 m*	20 m*

*Tämä pölyttäjärajoitus kattaa sivullisen ja asukkaan suojelua koskeva rajoituksen (5 m lohkon rajalta viljelykasviin).

Vesistörajoitus

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohde	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkemaa vähentävä suutin		
		50 %	75 %	90 %
Viljat, syys- ja kevätrypsi, syys- ja kevätrapsi	Ei sallittu	Ei sallittu	15 m	5 m
Herne, papu ja peruna	Ei sallittu	20 m	10 m	5 m
Valko-, kukka-, ruusu- ja parsakaali	Ei sallittu	Ei sallittu	20 m	10 m
Porkkana	Ei sallittu	Ei sallittu	20 m	10 m
Juurikkaat, punajuurikkaat	Ei sallittu	Ei sallittu	20 m	10 m
Omena ja päärynä	Ei sallittu	Ei sallittu	Ei sallittu	50 m

Muut rajoitukset

Valmisteen myöhäisin käyttöajankohta on öljykasveilla kukinnan alkaessa. Valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaalille sekä syysviljoilla syyskäsittelynä valmistetta saa käyttää kerran, muilla kasveilla korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana.

MUUT OHJEET

Resistenssin hallinta

Tehoaine tau-fluvalinaatti kuuluu vaikutustavaltaan IRAC-ryhmään (tehoaineryhmä 3A, pyretroidit). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä suuri. Valmisteen käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota resistenssinhallintaan ja sen takia käsittelyissä on noudatettava annettuja käyttömääriä, käsittelyjen määrä on minimoitava vuorottelemalla käyttöä muiden, vaikutustavaltaan (MoA) eri tehoaineryhmään kuuluvien, valmisteiden kanssa.

Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa (-10 ja + 30 asteen välissä).

Pakkausten ja valmisteen hävittäminen

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Valmisteen käyttöohje

Viljelykasvi / käyttökohde	Paikka / alue	Torjunnan kohde	Levitystapa	BBCH / Käsittelyajankohta	Käsittelyjen määrä vuodessa tai kasvukaudessa (minimi - maksimi)	Käsittelyjen väliin jäävä vähimmäisaika (vrk)	Valmisteen käyttömäärä (minimi - maksimi) ja yksikkö per käsittelykerta	Vesimäärä (Minimi - maksimi) ja yksikkö	Varoaika (vrk)
Syys- ja kevätviljat	avomaa	Kirvat, ripsiäiset, viljakukko	puomiruisku	BBCH 10-50, keväällä	1-2	10-14	0,15-0,2 l/ha	100-400 l/ha	30
Syys- ja kevätviljat	avomaa	Tähkä- ja vehnäsääski	puomiruisku	BBCH 41-59, keväällä	1-2	10-14	0,15-0,2 l/ha	100-400 l/ha	30
Syys- ja kevätvehnä, syys- ja kevätohra, ruisvehnä, kaura	avomaa	Viljasääski (Haplodiplosis marginata)	puomiruisku	BBCH 31-60, keväällä	1-2	10-14	0,15-0,2 l/ha	100-400 l/ha	30
Syysvehnä, syysohra, ruisvehnä, ruis	avomaa	Ohran keltakääpiökasvuvirus (BYDV) vektoreina viljakirva ja tuomikirva	puomiruisku	BBCH 11-30, syksyllä	1	-	0,2 l/ha	100-400 l/ha	30
Syys- ja kevätrypsi, syys- ja kevätrapsi	avomaa	Rapsikuoriainen, rapsikärsäkäs, litusääski, luteet	puomiruisku	BBCH 30-60	1-2	7	0,2 l/ha	100-300 l/ha	60
Herne ja pavut	avomaa	Juovahernekärsäkäs	puomiruisku	BBCH 10-19	1-2	14	0,2 l/ha	100-300 l/ha	tuoreherne 7, pavut ja kuivatut herneet 14
Herne ja pavut	avomaa	Hernekirva, juurikaskirva, herneripsiäinen, hernekääriäinen	puomiruisku	BBCH 50-71	1-2	14	0,2 l/ha	100-300 l/ha	tuoreherne 7, pavut ja kuivatut herneet 14
Peruna	avomaa	Kirvat, koloradonkuoriainen *	puomiruisku	BBCH 12-49	1-2	14	0,2 l/ha	100-400 l/ha	7
Valko-, puna, suippo-, savoijin-, kukka-, parsa-, ja ruusukaali	avomaa	Kaalikirva, rapsikuoriainen	puomiruisku	BBCH 10-49	1	-	0,3 l/ha	200 - 400 l/ha	7
Omena ja päärynä	avomaa	Omenakirva, omenanratamokirva, omenankäärökirva, pihlajanmarjakoi	puomiruisku	BBCH 54-79	1	-	0,3 l/ha	500-1000 l/ha	30
Omena ja päärynä	avomaa	Omenankukkakärsäkäs	puomiruisku	BBCH 54-79	1-2	10-14	0,3 l/ha	500-1000 l/ha	30
Porkkana	avomaa	Porkkanakemppi	puomiruisku	BBCH 10-45	1-2	10-14	0,3 l/ha	100-400 l/ha	14
Sokeri- ja rehujuurikas	avomaa	Juurikaskärpänen, juurikaskirva **	puomiruisku	BBCH 09-39	1-2	10-14	0,2 l/ha	100-400 l/ha	14
Punajuurikkaat, myös kelta- ja raitajuurikas	avomaa	Juurikaskärpänen, juurikaskirva **	puomiruisku	BBCH 09-39	1-2	10-14	0,2 l/ha	100-400 l/ha	14

* Koloradonkuoriaishavainnoista on viipymättä ilmoitettava Ruokaviraston kasvinterveyden valvontaan, joka määrää tarvittavat torjunta- ja hävittämistoimenpiteet.
** Valmisteen teho on kohtalainen, mutta käyttö vähentää juurikaskärpäsen ja -kirvan aiheuttamia vaurioita.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena

Lisätietoja tuotteesta osoitteessa www.syngenta.fi

Rekisteröidyt tavaramerkit
Syngenta Group Company: EVURE Neo

Evure Neo

INSEKTICID

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Karenstid

Kål: 7 dagar
Färska ärtor: 7 dagar
Potatis: 7 dagar
Torkade ärtor: 14 dagar
Bönor: 14 dagar
Spannmål: 30 dagar
Socker-, fodder och rödbetor: 14 dagar
Morot: 14 dagar
Äpple: 30 dagar
Päron: 30 dagar
Höst- och vårrybs: 60 dagar
Höst- och vårraps: 60 dagar

Begränsning av grundvatten

Växtskyddsmedlet kan röra sig i jorden och får därför inte användas på viktiga eller på andra för vattenförsörjningen lämpade grundvattenområden (klass 1 och 2). Runt brunnar och källor som används för hushållsvatten ska lämnas en minst 30–100 meter bred skyddszon som inte behandlas med växtskyddsmedel. Användning av växtskyddsmedel på grova mojordar eller ännu grövre jordarter bör undvikas.

Begränsningar för skydd av pollinerare

För att skydda leddjur ska ett skyddsavstånd (m) lämnas till vegetation utanför behandlingsområdet och/eller användas munstycken som minskar vindavdrift (%).

Användningsområde	Munstyckstyp		
	Spaltmunstycke	Munstycke som minskar vindavdriften	
		50 %	75 %
Spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps	15 m	10 m	5 m
Ärt, böna och potatis	15 m	10 m	5 m
Vit-, blom-, bryssel/rosenkål och broccoli	15 m	10 m	5 m
Morot	20 m	10 m	5 m
Betor, rödbetor	15 m	10 m	5 m
Äpple och päron	50 *	30 m*	20 m*

* Begränsningen omfattar även skyddsavståndet för utomstående och boende (5 m från skiftesgränsen till odlingsgrödan).

Vattenbegränsning

Förorena inte vatten med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsigt väder. Sprutans påfyllningsenhet får inte användas för att fylla på en traktorburen spruta med vatten ur ett vattendrag. Överbliven besprutningslösning och sprutrengöringsmedel får inte släppas ut i vatten.
Vid besprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag följande skyddsavstånd skall beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Användningsområde	Munstyckstyp			
	Spaltmunstycke	Munstycke som minskar vindavdriften		
		50 %	75 %	90 %
Spannmål, höst- och vårrybs, höst- och vårraps	Inte tillåtet	Inte tillåtet	15 m	5 m
Ärt, böna och potatis	Inte tillåtet	20 m	10 m	5 m
Vit-, blom-, bryssel/rosenkål och broccoli	Inte tillåtet	Inte tillåtet	20 m	10 m
Morot	Inte tillåtet	Inte tillåtet	20 m	10 m
Betor, rödbetor	Inte tillåtet	Inte tillåtet	20 m	10 m
Äpple och päron	Inte tillåtet	Inte tillåtet	Inte tillåtet	50 m

Andra begränsningar

Senaste tidpunkt för användning av preparatet på oljeväxter är vid blomningens början. Höstspannmål på hösten, vitkål, blomkål, broccoli och brysselkål samt i höstsäd vid höstbehandling får preparatet användas en gång. På övriga grödor får preparatet användas högst två gånger per växtsäsong.

ANDRA ANVISNINGAR

Hantering av resistens

Det verksamma ämnet tau-fluvalinat tillhör gruppen IRAC (verkningssätt 3A, pyretroider). Risken att utveckla resistens med denna produkt i dessa användningsändamål är för närvarande hög. Vid användning av preparatet ska särskild uppmärksamhet fästas vid resistenshanteringen. Därför ska de rekommenderade doserna följas vid behandlingarna, och antalet behandlingar ska minimeras genom att användningen växlas med preparat som tillhör andra grupper av verksamma ämnen med en annan verkningsmekanism (MoA).

Lagring och hållbarhet

Förvaras i torrt och svalt utrymme (mellan -10 och + 30 grader).

Förstöring av förpackningar och produkt

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel lämnas till insamlingspunkt för farligt avfall och tomma och sköljda förpackningar lämnas till avfallsstation.

Bruksanvisning av produkt

Gröda/situation	Var/ område	Syfte	Behandlingsut-rustning / metod	BBCH Utvecklingsstadium/ tidpunkt	Minimum-max. Antal behandlingar per år eller period.	Minst antal dagar mellan behandlingar	Preparatets min och max dos och enhet vid en enskild behandling	Vattenmängd (min-max) och enhet	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd
Höst och vårspannmål	friland	Bladlöss, tripsar, sädesbladbagge	bomspruta	BBCH 10-50, på våren	1-2	10-14	0,15-0,2 l/ha	100-400 l/ha	30
Höst och vårspannmål	friland	Röda vetemyggan, gula vetemyggan	bomspruta	BBCH 41-59, på våren	1-2	10-14	0,15-0,2 l/ha	100-400 l/ha	30
Höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, havre	friland	Sadelgallmygga (Haplodiplosis marginata)	bomspruta	BBCH 31-60, på våren	1-2	10-14	0,15-0,2 l/ha	100-400 l/ha	30
Höstvete, höstkorn, rågvete, råg	friland	Havrerödsot (BYDV), med sädesbladlus och häggbladlus som vektorer	bomspruta	BBCH 11-30, på hösten	1	-	0,2 l/ha	100-400 l/ha	30
Höst- och vårraps, höst- och vårrybs	friland	Rapsbagge, rapsvivel, skidgallmygga, stinkfly	bomspruta	BBCH 30-60	1-2	7	0,2 l/ha	100-300 l/ha	60
Ärter, bönor	friland	Randig ärtvivel	bomspruta	BBCH 10-19	1-2	14	0,2 l/ha	100-300 l/ha	färska ärtor 7, bönor och torkade ärter 14
Ärter, bönor	friland	Ärtbladlus, betbladlus, ärttrips, ärtvecklare	bomspruta	BBCH 50-71	1-2	14	0,2 l/ha	100-300 l/ha	färska ärtor 7, bönor och torkade ärter 14
Potatis	friland	Bladlöss, koloradoskal-bagge *	bomspruta	BBCH 12-49	1-2	14	0,2 l/ha	100-400 l/ha	7
Vit-, röd-, spets-, savoy-, blom- och rosenkål, broccoli	friland	Kålbladlus, rapsbaggar	bomspruta	BBCH 10-49	1	-	0,3 l/ha	200 - 400 l/ha	7
Äpple och päron	friland	Grön äpplebladlus, röd äpplebladlus och hundkäx-äpple-bladlus, rönnbärsmal,	bomspruta	BBCH 54-79	1	-	0,3 l/ha	500-1000 l/ha	30
Äpple och päron	friland	Äppleblomvivel	bomspruta	BBCH 54-79	1-2	10-14	0,3 l/ha	500-1000 l/ha	30
Morot	friland	Morotsbladloppa	bomspruta	BBCH 10-45	1-2	10-14	0,3 l/ha	100-400 l/ha	14
Socker- och foderbetor	friland	Betfluga, betbladlus **	bomspruta	BBCH 09-39	1-2	10-14	0,2 l/ha	100-400 l/ha	14
Rödbetor, också gulbeta och randig rödbeta	friland	Betfluga, betbladlus **	bomspruta	BBCH 09-39	1-2	10-14	0,2 l/ha	100-400 l/ha	14

* Observationer av koloradoskalbagge ska omedelbart anmälas till Livsmedelsverkets växtskyddstillsyn, som beslutar om nödvändiga bekämpnings- och utrotningsåtgärder.
** Måttlig effekt, men användningen minskar skador orsakade av betfluga och betbladlus.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.fi

Registrerade varumärken
Syngenta Group Company: *EVURE Neo*

Evure Neo

syngenta®

HYÖNTEISMYRKKY / INSEKTICID

GROUP 3A INSECTICIDE

Käyttötarkoitus
Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, syys- ja kevätrypsiltä, syys- ja kevätrapsilta, herneeltä, pavulta, perunalta, valko-, puna-, suippo-, savoijin-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä, porkkanalta, sokeri-, puna- ja rehujuurikkailta.

Användningsändamål
Bekämpning av de i bruksanvisningen nämnda skadeinsekter i spannmål, höst- och vårraps, höst- och vårrybs, ärter, bönor, potatis, vit-, röd-, spets-, savoy-, blom- och rosenkål, broccoli, äpple och päron, morot, socker-, foder- och rödbetor.

1 L

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company



VAROITUS
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P391 Valumat on kerättävä.
EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

VARNING
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P391 Samla upp spill.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tuhoeläinten torjuntaan / Skadedjursmedel

Suojainohjeet / Skyddsutrustning: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. / Vid hantering av produkten bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalieresistenta skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad.

Tehoaine / Verksam substans: Tau-fluvalinaatti 240 g/l (24% w/v) / Tau fluvalinat 240 g /L (24% w/v)

Valmistetyyppi / Preparattyp: EW

Användargrupp / Käyttäjäryhmä: Yrkesanvändare / Ammattikäyttäjät

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3450

Nettotilavuus/Nettovolum: 1 L

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare
ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg 87, 3830 AK Leusden, Holland
Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare
ADAMA Registrations B.V, Arnhemseweg 87, 3830 AK Leusden, Holland
Edustaja/Representant
Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S, Tanska/Danmark, Tel +45 32 87 11 00

Valmistuserä ja valmistuspäivä: Katso pakkus.

Partinummer och tillverningsdatum: Se förpackningen.

5 707239 302855

L1158866 FINL/10E PPE 4263066

L1158866 FINL/10E PPE 4263066